



โรคพิษสุนัขบ้า

อันตรายถึงชีวิต!

โรคพิษสุนัขบ้า หรือ โรคกลัวน้ำ ภาษาอีสานเรียก โรคหมาว้อ เกิดจาก เชื้อไวรัสเรบีส (Rabies) เป็น โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เมื่อถูกสัตว์มีเชื้อพิษสุนัขบ้า กัด ข่วน หรือ เลียบาดแผล สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดที่ติดเชื้อ เป็นพาหะนำโรค เช่น หมู กระรอก ค้างคาว สุนัข นก ค่างวายน พบบ่อยที่สุด คือ สุนัข รองลงมา คือ แมว และ วัว เมื่อผู้ติดเชื้อมีอาการแล้ว จะไม่สามารถรักษาให้หายได้ และ เสียชีวิตทุกราย



อาการในสัตว์



ระยะเริ่มแรก

นิสัยเปลี่ยนไปจากเดิม ไม่ร่าเริง
เก็บตัว หวาดระแวง



ระยะตื่นเต้น

มีอาการทางระบบประสาท อยู่ไม่นิ่ง
หยุดหจิด กัดทุกอย่าง ม่านตาขยาย



ระยะอัมพาต

สิ้นห้อยสิดำคล้ำ อัมพาตทั่วตัว และตาย



อาการในคน



ระยะฟักตัว

3 สัปดาห์ - 6 เดือน บางรายระยะ
ฟักตัวสั้น ไม่ถึงสัปดาห์ หรือเกิน 1 ปี



อาการ

เมื่ออาหาร เจ็บคอ มีไข้ อ่อนเพลีย
คันแผลรุนแรง กระสับกระส่าย
เพื่อจ้อง กลัวแสง กลัวลม กลัวน้ำ
กลืนลำบาก แขนงหน้าอก ชักเกร็ง
เป็นอัมพาต และ เสียชีวิตในที่สุด



วิธีป้องกัน



นำสัตว์เลี้ยงรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ตามกำหนดทุกปี



ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงออกนอกบ้านตามลำพัง
โดยไม่อยู่ในสายจูง



หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ ที่ไม่ทราบประวัติ
การฉีดวัคซีนที่ชัดเจน



ระวังไม่ให้ถูกสัตว์กัดข่วนหรือเลียบาดแผล



ไม่นำสัตว์ป่ามาเลี้ยง



หากถูกกัด ทำอย่างไร ?



ล้างแผล ด้วยน้ำสะอาด
และสบู่ หลายๆ ครั้ง



ใส่ยา เบตาดีน
ฆ่าเชื้อ



กักหมา สังเกตอาการ
อย่างน้อย 10 วัน



หาหมอ
ฉีดวัคซีนตามกำหนด



คำแนะนำ 5 ย.

อย่าแหยม

ให้สุนัขโกรธ

อย่าเหยียบ

หาง หู ตัว ขา
ให้สุนัขตกใจ

อย่าแหยก

สุนัขที่กำลังกัดกัน
ด้วยมือเปล่า

อย่าหยิบ

ขาม ข้าง
ขณะสุนัขกำลังกิน

อย่ายุ่ง

หรือเข้าใกล้สัตว์
ที่ไม่มีเจ้าของ